



	PAG
DISERBANTE TOTALE	55
GLOXY	56
DISERBANTE SELETTIVO	57

	PAG
DICOPHAR®	58
FOXTAIL	59

CARATTERISTICHE

PREMIUM TOP è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni e perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. PREMIUM TOP non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

COMPOSIZIONE

	per 100 g
GLIFOSATE ACIDO PURO	31 g (=360 g/l)
sottoforma di sale isopropilamminico	41,7 g
Acqua e coadiuvanti q.b. a	100 g

FORMULAZIONE

Liquido

REGISTRAZIONE

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali No. 10.494 del 31.05.2000

PERIODO D'IMPIEGO

G F M A M G L A S O N D

LOTTA CONTRO

GRAMINACEE INFESTANTI GENERICHE



IMPIEGO

Annuali e bienni. 1,5-4 l/ha: Alopecurus sp., Avena sp., Hordeum murinum, Lolium sp., Mercurialis sp., Poa sp., Riso crodo, Ammi majus, Amaranthus sp., Calendula sp., Chenopodium sp., Orobanche sp., Portulaca sp., Raphanus sp., Senecio sp., Sinapis sp., Stellaria sp., Veronica sp. **Perenni.** 4-5 l/ha: Agropyron repens, Carex sp., Cirsium sp., Euphorbia sp., Glyceria sp., Hipericum sp., Laersia oryzoides, Phalaris sp., Rumex sp., Sonchus sp., Sorghum halepense. 5-7 l/ha: Alisma sp., Asfodelus sp., Butomus sp., Cyperus sp., Ferula sp., Juncus sp., Nardus sp., Scirpus sp., Sparganium sp., Tussilago sp. 8-10 l/ha: Agrostis sp., Allium sp., Artemisia sp., Arundof sp., Cynodon sp., Eragrostis sp., Glechoma sp., Oxalis sp., Paspalum sp., Phragmites sp., Pteridium sp., Ranunculus sp., Rubus sp., Thpha sp., Urtica sp., 12 l/ha: Aristolochia sp., Clematis sp., Convolvulus sp., Rubia peregrina. **Arbusti.** 4-6 l/ha: Acer sp., Fraxinus sp., Genista sp., Salix sp., Sambucus sp., Vaccinum sp. 10-12 l/ha: Calluna sp., Cistus sp., Erica sp., Lonicera sp. Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva) Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate, la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva).

AREE NON DESTINATE ALLE COLTURE AGRARIE, SEDI FERROVIARIE, ARGINI DI CANALI, FOSSI, SCOLINE, AREE RURALI E INDUSTRIALI, AREE ED OPERE CIVILI.



DISERBANTE TOTALE

PREMIUM TOP - ERBICIDA SISTEMICO DI POST-EMERGENZA

Erbicida in post-emergenza per il controllo delle infestanti annuali, bienni e perenni

INTERVALLO DI SICUREZZA

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

COD. ART.	CONFEZIONI	PZ/CARTONE	IVA	CODICE A BARRE
8233210	250 ML	24	10%	8 002297 089593
8233211	1 LT	20	10%	8 002297 089609
8233212	5 LT	1	10%	8 002297 089616



CONTIENE MISURINO DOSATORE



CARATTERISTICHE

È una miscela contenente Glifosate, caratterizzato da azione di contatto, elevata sistemica e ampio spettro d'azione ed Oxifluorfen, a effetto di contatto. Il formulato consente un rapido contenimento di molte delle malerbe normalmente presenti in frutteto e vigneto e una sensibile riduzione delle rinascite. La miscela può essere applicata anche per il diserbo di aree industriali, civili, bordi stradali, argini.

COMPOSIZIONE

	per 100 g
GLIFOSATE acido puro (da sale isopropilamminico)	30 g (=360 g/l)
OXIFLUORFEN	2,5 g (=30 g/l)
Coformulanti q.b. o	100 g

FORMULAZIONE

Liquido

REGISTRAZIONE

Registrazione del Ministero della Salute No. 13.403 del 02.04.2007



PERIODO D'IMPIEGO

G F M A M G L A S O N D

LOTTA CONTRO

GRAMINACEE



MALERBE



GLOXY

DISERBANTE TOTALE AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

Erbicida miscela contenente glifosate, caratterizzato da azione di contatto, elevata sistemica e ampio spettro + oxyfluorfen a effetto di contatto aree non coltivate di pre e post-emergenza

IMPIEGO

Vite e frutteti (melo, pero e drupacee): Interventi autunnali contro tutte le graminacee e dicotiledoni annuali e le nascite delle principali infestanti invernali, quali: Centocchio, Veronica, Falsa ortica, Senape, Ravanella selvatica, Borsa del Pastore e altre Crucifere, Poe, Loietta, Coda di volpe e Avene alla dose di 1,5-2 litri/ha da aumentare fino a 3 litri/ha nel caso di forti infestazioni o con infestanti adulte e non in attiva crescita. In primavera si può intervenire precocemente, con vegetazione ancora ferma e infestanti non eccessivamente sviluppate, sia nei confronti delle annuali già emerse quali le principali Crucifere, Veronica, Papavero, le prime nascite di Polygoni, sia verso le perennanti quali Romice, Stoppione, Ortiche, Malva e Artemisia alla dose di 2 litri/ha di formulato che deve essere aumentato a 3 litri/ha soprattutto in presenza delle perennanti più difficili. Se si posticipa l'intervento alla piena primavera, si ottengono ottimi risultati su Vilucchio e sulle infestanti tipicamente estive, quali Amaranto, Farinaccio comune, Parcellana, Erba morella alla dose di 1,5-2 litri/ha. **Olivo:** intervenire fino a una settimana prima della raccolta su vegetazione sviluppata o su ricacci da stalfi precedenti alla dose di 2 litri/ha. In caso di forti infestazioni o con infestanti adulte e non in attiva crescita innalzare la dose a 3 litri/ha. Utilizzare il prodotto con volumi d'acqua di 200-600 litri/ha di acqua impiegando i volumi maggiori in presenza di infestanti sviluppate. **Diserbo totale degli incolti** (aree industriali e civili, bordi stradali, argini e sedi ferroviarie). Dosi per uso hobbistico 300 ml x 1.000 m² per il controllo della maggior parte della flora presente.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta delle olive.

PRODOTTO IN ESAURIMENTO

COD. ART.	CONFEZIONI	PZ/CARTONE	IVA	CODICE A BARRE
8233603	200 ML	24	10%	8 002297 089852
8233703	500 ML	24	10%	8 002297 089869



CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida che svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe con cui giunge a contatto. Il prodotto viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica. Date queste sue caratteristiche il prodotto è in grado di controllare anche le malerbe dicotiledoni perennanti quali *Convolvulus arvensis* e *Cirsium arvense*. La sua azione si estende poi alla generalità delle malerbe annuali.

COMPOSIZIONE

	per 100 g
DICAMBA puro	21,2 g (240 g/l)
Coformulanti q.b. a	100 g

FORMULAZIONE

Liquido

REGISTRAZIONE

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali No. 11.586 del 06.02.2003

PERIODO D'IMPIEGO

G F M A M G L A S O N D

LOTTA CONTRO









IMPIEGO

Erbicida selettivo per prati ornamentali. Assicura il controllo di un gran numero di infestanti annuali e poliennali a foglia larga. Irrorare uniformemente il tappeto erboso, dosi per uso hobbistico 10-12 ml di prodotto per 100 m² in 5 Lt d'acqua. Trattare prima del taglio del prato per favorire un migliore assorbimento, ripetendo 2 o 3 interventi a partire dalla primavera.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti prima del raccolto 30 giorni per il melo, 20 giorni per le altre colture.

COD. ART.	CONFEZIONI	PZ/CARTONE	IVA	CODICE A BARRE
8235103	 100 ML	24 	10%	 8 002297 090391
8235104	 500 ML	24 	10%	 8 002297 089722



CONTIENE
MISURINO
DOSATORE

DISERBANTE SELETTIVO

POST - EMERGENZA

DICAMBA

Erbicida selettivo dicotiledoni annuali

CONTIENE
MISURINO
DOSATORE**CARATTERISTICHE**

Combatte efficacemente le maggior essenze erbacee delle infestanti dicotiledoni che infestano i campi da golf, i campi sportivi e le aree ricreative. La sua efficacia si esplica maggiormente su: Amaranzo comune, Atriplice, Miogro rastellato, Borsa del pastore, Fiordaliso, ciano selvatico, Farinaccio, Vilucchio dei campi, Ruchetta, Canapa selvatica, Galinsoga comune, Camomilla comune, Non ti scordar di me, Papavero, Ravanello selvatico, Ranuncolo dei campi, Rapistro rugoso, Senape selvatica, Grespino, Stregonia annuale, Erba stoma comune.

COMPOSIZIONE

	per 100 g
2,4-D puro	6,69 g (70 g/l)
DICAMBA	1,88 g (20 g/l)
MCPA	6,59 g (70 g/l)
MCPP-P	3,95 g (42 g/l)
Coformulanti q.b. o	100 g

FORMULAZIONE

Liquido

REGISTRAZIONE

Registrazione del Ministero della Salute No. 15.034 del 25.02.2011

PERIODO D'IMPIEGO

G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D

LOTTA CONTRO

INFESTANTI A FOGLIA LARGA



DICOPHAR®

DISERBANTE DICOTILENODICA DI POST EMERGENZA AD AMPIO SPETTRO**Per l'impiego su campi da golf, campi sportivi e aree ricreative****IMPIEGO**

Si applica sul tappeto erboso con pompa a spalla alla dose di 100ml in 10 litri d'acqua utilizzando i 10L/acqua su 100m². In alternativa può essere distribuito con annaffiatoio diluendo 10ml di prodotto in 10L di acqua distribuendo la soluzione su 10m². Il prodotto va applicato o 7 giorni prima o almeno 5 giorni dopo le operazioni di sfalcio del prato.

COD. ART.	CONFEZIONI	PZ/CARTONE	IVA	CODICE A BARRE
8235100	 100 ML	24 	10%	 8 002297 089586
8235101	 1 LT	12 	10%	 8 002297 089579



CARATTERISTICHE

Può essere utilizzato contro le erbe infestanti dei tappeti erbosi costituiti da: *Poa pratensis*, *Lolium perenne*, *Festuca rubra*, *Festuca arundinacea*, *Poa annua*, *Zoysia* spp., *Agrostis palustris* tagliata ad altezza non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la prima stagione di crescita. Il prodotto agisce per assorbimento fogliare. Erbe infestanti sensibili: Sanguinella sottile (*Digitaria ischaemum*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Gramigna indiana (*Eleusine indica*), Giovane (*Echinochloa crus-galli*), Pabbio (*Setaria* spp.), Panico (*Panicum* spp.), Sorghetto da seme (*Sorghum halepense*); con trattamenti ripetuti Gramigna (*Cynodon dactylon*), Sorghetto da rizoma (*Sorghum halepense*).

COMPOSIZIONE

	per 100 g
FENOXAPROP-P-ETILE puro	2,75 g (= 28 g/l)
Coformulanti q.b. a	100 g

FORMULAZIONE

Liquido



REGISTRAZIONE


Registrazione del Ministero della Salute No. 12.534 del 30.10.2007

PERIODO D'IMPIEGO

G F M A M G L A S O N D

LOTTA CONTRO

SANGUINELLA COMUNE



GRAMIGNA



IMPIEGO

Utilizzare dopo l'emergenza delle erbe infestanti. Contro *Digitaria ischaemum*, *Digitaria sanguinalis*, *Eleusine indica*, *Echinochloa crus-galli*, *Setaria* spp., *Panicum* spp., *Sorghum halepense* da seme: 2,5-3,5 l/ha da 3 foglie a 2 culmi di accestimento dell'infestante. 5,0 l/ha per tappeti costituiti da *Poa pratensis*, *Zoysia* spp., oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti. 7,0 l/ha per tappeti costituiti da *Lolium perenne*, *Festuca rubra* f. *arundinacea*, *Poa annua*, oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti. 3,0-4,0 l/ha contro *Cynodon dactylon*, *Sorghum halepense* da rizoma: iniziare i trattamenti subito dopo la ripresa vegetativa delle infestanti, ripetendo il trattamento ogni 4-7 settimane per mantenere l'arresto dell'accrescimento. 5 l/ha contro *Digitaria ischaemum*, *Digitaria sanguinalis*, su tappeti di *agrostis palustris*, con infestanti a 1-2 foglie; ripetere i trattamenti allo stesso stadio, con intervalli di almeno 3 settimane. Nei casi di emergenze scalari delle infestanti ripetere il trattamento dopo almeno 2 settimane su infestanti in attiva crescita; non superare la quantità totale di 22 l/ha per stagione vegetativa. Volume di irrorazione: Trattamenti a pieno campo: 300-600 l/ha di acqua. Trattamenti localizzati: 50-100 ml di FOXTAIL in 10 litri di acqua, da 1-4 foglie a 1-2 culmi di accestimento delle infestanti. L'accurata bagnatura delle infestanti è determinante per il buon esito del trattamento. Non distribuire il prodotto con sistemi di irrigazione. Avvertenze agronomiche: Trattare prima del taglio quando è presente la massima superficie fogliare e con infestanti in attiva fase di crescita. Evitare i trattamenti su tappeti erbosi sofferenti. In caso di siccità, irrigare 1-7 giorni prima del trattamento; dopo l'applicazione, attendere almeno 1-3 ore prima di irrigare. Non tagliare il tappeto erboso per almeno 24 ore dopo il trattamento, per permettere l'azione dell'erbicida. Intervenire su plantule di *Poa pratensis*, *Festuca rubra*, *F. Arundinacea*, *Lolium perenne* emerse da un mese o accestite, con intervalli di 2 mesi tra applicazioni successive. La semina di rinfoltimento (*overseeding*) di tappeti di *Lolium perenne* *Festuca rubra*, *F. Arundinacea* può essere effettuata subito dopo il trattamento; per altre specie attendere 3 settimane. Evitare il trattamento di zolle da trapiantare, un mese prima e un mese dopo la loro rimozione e trapianto.



FOXTAIL

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA

Contro le erbe infestanti dei tappeti erbosi

COD. ART.	CONFEZIONI	PZ/CARTONE	IVA	CODICE A BARRE
8235105	250 ML	24	10%	8 002297 130233